Methocel® 2%

OMNIVISION

Dispositif médical
Solution stérile pour l'examen ophtalmologique au moyen de verres de contact diagnostiques. Fabriquée sous conditions aseptiques. (La solution a été stérilisée en autoclave et mise en flacons dans des conditions d'asepsie).

Composition

1 ml de Methocel 2% contient: 20 mg d'hydroxypropylméthylcellulose, 0,1 mg de chlorure de benzalkonium (conserv.), Acidum boricum, Aminohydroxymethylpropandiolum, eau pour préparations injectables.

Propriétés/Effets

Methocel 2% est une solution de viscosité élevée, incoloré, transparente et isotonique d'hydroxypropylméthylcellulose. De par la très haute qualité de l'hydroxypropylméthylcellulose utilisée, la viscosité peut être établie avec précision.

Indications/Possibilités d'emploi

Comme solution de contact pour l'examen du fond de l'oeil au moyen du verre de contact de la lampe à fente (gonioscopie, fundoscopie) ou traitement du fundus (trabeculoplastie au laser d'argon).

Posologie/Mode d'emploi

Avant l'emploi, la concavité du verre de contact doit être nettoyée à fond avec un désinfectant approprié. Instiller 1 à 2 gouttes dans la concavité du verre de contact.
Pour enlever le verre de contact, on doit le basculer pour éviter une possible aspiration.
Immédiatement après l'examen, on doit contrôler si l'épithelium est indemne.
Les verres de contact diagnostiques doivent être utilisés seulement par des spécialistes exercés.

Limitations d'emploi

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Effets indésirables

Après l'emploi de Methocel 2% peuvent apparaître occasionellement des rougeurs et des tuméfactions passagères de la conjonctive.

Remarques particulières

Premier usage seulement en cas d'une fermeture intacte de garantie.
Garder hors de la portée des enfants.
Seulement pour usage externe. N'est pas destiné à l'emploi intra-oculaire.

Conservation/stabilité

Les flacons non entamés de Methocel 2% peuvent être utilisés jusqu'à la date de péremption indiquée.
Conserver à une température de 15-25 °C. Une fois ouvert ne pas utiliser plus de 3 mois.
Remarque: l'utilisation de Methocel 2% est facilitée si le flacon est entreposé «à l'envers», c'est-à-dire en le posant sur le capuchon.

Mise à jour de l'information

Juillet 2004.